

Gummiring-Abbindung

Bei Ihnen wurde mittels Gummiring bei _____ Uhr SSL

eine Hämorrhoide eine Schleimhautfalte abgebunden.

Dieses abgebundene Gewebe schrumpft nun und fällt in den nächsten 2–3 Wochen mit dem Gummiring ab, meist ohne im Stuhl erkennbar zu sein.

Wenn nicht aus Gründen anderer Erkrankungen unbedingt notwendig, sollte die **Einnahme aspirin-haltiger Medikamente** (z. B. Spalt, Godamed, Thomapyrin, ASS usw.) **für die nächsten 3 Wochen vermieden werden**, sonst könnte eine erhöhte Nachblutungsgefahr resultieren!

Gelegentlich kommt es beim Abfallen der Hämorrhoiden zu einer kleinen, harmlosen Blutung. **Dies ist normal und sollte Sie nicht beunruhigen!**

Extrem selten kann es dabei auch stärker bluten.

Sollte diese Blutung nicht aufhören, rufen Sie uns an:

Praxis: 0621 / 123475-0

Klinik: 0621 / 383-2333

ODER lassen Sie sich ins nächste Krankenhaus fahren!

Falls erforderlich, empfehlen wir bei Druck oder Schmerz im After ein Schmerzmittel (z. B. Ibuprofen o. Diclofenac). Sie sind weiterhin arbeitsfähig; aber Sie sollten sich heute mit anstrengendem Sport zurückhalten.

Diese Information für 3 Wochen griffbereit haben!